

INSTRUCTIVO PARA CIRUGÍA REFRACTIVA / LASIK

1

Por favor, lea atentamente este instructivo.
**SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES
CORRECTAMENTE CUMPLIENDO TODOS
LOS PASOS, LA CIRUGÍA PUEDE
DEMORARSE O DIRECTAMENTE
SUSPENDERSE.**

Lugar: Centro de Cirugía Ambulatoria
del Sanatorio San Carlos
Av. Belgrano 100 – 1er piso (“5 Esquinas”)

Fecha Cirugía: _____

Horario en que debe llegar al quirófano: _____

DÍAS PREVIOS A LA CIRUGÍA

Si su cobertura médica lo requiere, tramitar la **AUTORIZACIÓN DE CIRUGÍA**, y entregarla en la recepción de Frey 111.

Suspender el uso de los lentes de contacto al menos un día antes de la cirugía.

Completar y firmar el **CONSENTIMIENTO INFORMADO**.

Completar y firmar la **PLANILLA DE ANTECEDENTES MÉDICOS**.

Adquirir la medicación recetada y los lentes de contacto terapéuticos.

DÍA DE LA CIRUGÍA ANTES DE IR AL CENTRO DE CIRUGÍA

4 HORAS ANTES DE LA CIRUGÍA

Debe hacer **AYUNO TOTAL**. Puede beber solamente agua hasta 2 horas antes

1 HORA Y MEDIA (90 minutos) ANTES DE LA HORA DE LA CIRUGÍA

Debe **COLOCARSE EN EL/LOS OJO/S QUE SE VA A OPERAR:**

VIGADEXA (Antibiótico y Antiinflamatorio)

1 gota cada 30 minutos (3 gotas en total)



No llevar joyas y/o elementos de valor al quirófano.
No utilizar maquillaje ni las uñas pintadas.

Concurrir con:

1. Anteojos de sol
2. Las dos gotas recetadas
3. Consentimiento informado, completo y firmado.
4. Planilla de antecedentes médicos, completa y firmada.

Concurra acompañado, tanto al ingreso como al momento de retirarse, luego de la cirugía.

Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con:

Coordinación Quirúrgica · Ariel Vitasse ☎ +549 294 4782979

Servicio de Oftalmología · Sólo Whatsapp 📞 +549 294 4569921





EN EL CENTRO DE CIRUGÍA

2

Luego de su admisión en Recepción, se le suministrará un ansiolítico sublingual.

Al ingresar al área quirúrgica, usted irá al vestuario donde la enfermera le entregará un camisolín para utilizar sobre su ropa interior. El anestesiólogo le realizará una serie de preguntas sobre sus antecedentes médicos.

En el quirófano se recostará en la camilla del equipo de láser, se le colocarán gotas anestésicas y antisépticas. Se le cubrirá el rostro con una tela y se separarán las pestañas con cinta adhesiva estéril.

Es importante, para lograr un resultado óptimo, colaborar con el cirujano siguiendo la luz verde que titilará delante de su ojo para alcanzar una correcta alineación y centrado del tratamiento.

Durante el procedimiento manténgase lo mas quieto posible procurando avisar antes de realizar cualquier movimiento, toser o acomodarse.

Puede sentir molestias leves o sensibilidad a la luz durante el procedimiento, pero nunca dolor.

Desde el momento de ingreso al área quirúrgica hasta la salida transcurrirán aproximadamente 30 minutos. Luego será controlado en un box de recuperación y será dado de alta para regresar a su domicilio, con las indicaciones y fecha de control.

Luego de la cirugía Ud. podrá retirarse, acompañado, a su domicilio, utilizando los anteojos de sol.

DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

GOTAS OFTÁLMICAS

Una hora después de la cirugía colocar VIGADExA cada 3 horas y DROPSTAR a demanda. Dejar pasar 3 minutos entre cada tipo de gota.

A partir del día siguiente, colocar VIGADExA 4 veces por día (desayuno, almuerzo, merienda, cena) y DROPSTAR a demanda, según las molestias que sienta, siempre dejando pasar 3 minutos entre cada tipo de gota si tocan juntas. Hasta el siguiente control.

No es necesario interrumpir las horas de sueño para colocarse ninguna de las dos gotas.

No debe frotarse los ojos.

Los lentes de contacto serán retirados por el cirujano en el control de la semana siguiente a la cirugía.

BAJO NINGÚN CONCEPTO DEBE TOCAR O FROTAR LOS OJOS

Si los lentes de contacto llegaran a salirse, retirarlos tirando el lente hacia abajo sin presionar ni tocar el ojo, y no volver a colocarlos.

Las primeras 48 a 72 horas es habitual tener molestias leves, fotofobia (molestias con la luz) y visión borrosa.

